

ANVÄNDARINFORMATION

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Gastrosan, tabletter.

2 VAD INNEHÅLLER GASTROSAN?

1 tablett innehåller
Kalciumkarbonat 420 mg, magnesiumtrisilikat 90 mg,
Mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, eukalyptusolja, kanelolja.

3 HUR VERKAR GASTROSAN?

Gastrosan verkar genom att neutralisera magsyran. Effekten kommer inom några minuter.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/

Carls-Bergh Pharma AB
Box 47076
402 58 Göteborg
Tel.031-332 36 30
E-post: info@carls-bergh.se

Information lämnas av:

Medasta AB
Västergatan 36
211 21 Malmö
Tel. 040-47 36 37

5 VAD ANVÄNDS GASTROSAN FÖR?

Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar.

6 NÄR SKA GASTROSAN INTE ANVÄNDAS?

Gastrosan ska inte användas vid för hög kalciumhalt i blodet eller vid nedsatt njurfunktion.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR GASTROSAN ANVÄNDS:

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt leverfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

GRAVIDITET

Inga kända risker vid användning under graviditet.

AMNING

Inga kända risker vid användning under amning.

TRAFIKVARNING

Inga kända risker.

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER GASTROSAN?

Tala om för Din läkare eller apotekspersonal om Du använder andra läkemedel samtidigt som Du tar Gastrosan. Det finns läkemedel som kan påverkas av intag av Gastrosan t ex:

Läkemedel innehållande järn, tetracyklin (antibiotika t e x Doxyferm, Vibramycin) och fluorokinolon (t e x Ciprofloxacin, Lexinor), ketokonazoltabletter (läkemedel vid svampinfektion t e x Fungoral tabletter), penicillamin (läkemedel mot inflammation och reumatism), estramustin (läkemedel för tumörbehandling t e x Estracyt), diflunisal (smärtstillande t e x Donobid), sotalol (hjärtläkemedel t e x Sotacor), mykofenolatmofetil (läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ t e x CellCept), klodronat och risedronat (läkemedel vid benskörhet t e x Bonefos och Optinate), gabapentin (läkemedel mot epilepsi t e x Neurontin), digoxin (hjärtläkemedel t e x Digoxin Recip) och fosinopril (läkemedel för behandling av högt blodtryck t e x Monopril).

7 DOSERINGSANVISNING

Vuxna och barn över 12 år:

1-2 tabletter vid behov, dock högst 8 tabletter per dag. Tabletterna bör sväljas med dryck, hela eller delade. Gastrosan skall inte användas längre än 2 veckor per behandlingstillfälle. Rekommenderas ej till barn under 12 år.

VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS?

Om du fått i dig för stor mängd av preparatet eller om t. ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN GASTROSAN GE?

I sällsynta fall kan biverkningar som förstoppning, diarré eller illamående förekomma. Kontakta läkare om du misstänker att Gastrosan gett dig allvarliga biverkningar.

9 HUR SKA GASTROSAN FÖRVARAS?

Förpackningen skall förvaras torrt och i rumstemperatur. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR GASTROSAN?

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2008-07-04